

10/031,14y

PCT/EP 00/07253

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 29 SEP 2000

WIPO

PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

EP 00/07253

Aktenzeichen: 100 14 085.8

Anmeldetag: 22. März 2000

Anmelder/Inhaber: BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen/DE

Bezeichnung: Neue Cytochrom P450-Monooxygenasen und deren
Verwendung zur Oxidation von organischen Ver-
bindungen

IPC: C 12 N, C 07 H, C 12 P

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 07. September 2000
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
Im Auftrag

Hoiß

A 1
08
ED

Neue Cytochrom P450-Monooxygenasen und deren Verwendung zur Oxidation von organischen Verbindungen

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Cytochrom P450-Monooxygenasen, welche zur Oxidation verschiedener organischer Substrate, wie z.B. N-heterocyclischer aromatischer Verbindungen, befähigt sind, dafür kodierende Nukleotidsequenzen, diese Sequenzen enthaltende Expressionskonstrukte und Vektoren, damit transformierte Mikroorganismen, Verfahren zur mikrobiologischen Oxidation N-heterocyclischer aromatischer Verbindungen und insbesondere Verfahren zur Herstellung von Indigo und Indirubin.

Enzyme mit neuartigen Funktionen und Eigenschaften können entweder durch Screening natürlicher Proben oder durch Protein Engineering bekannter Enzyme bereitgestellt werden. Die letztgenannte Methode kann unter Umständen die geeignetere sein, um Eigenschaften zu induzieren, deren Generierung auf dem Wege natürlicher Selektion unwahrscheinlich ist. Trotz zahlreicher Anstrengungen zum Engineering von Enzymen gibt es bisher nur wenige erfolgreiche Studien zur Förderung der katalytischen Aktivität von Enzymmutanten bezüglich eines bestimmten Substrates (1-10). In diesen bekannten Fällen sind die Substrate strukturell eng verwandt mit dem nativen Substrat des jeweiligen Enzyms. Bisher gibt es keine Berichte über ein erfolgreiches Engineering von Enzymen, welche nach der Modifikation die Umsetzung einer Verbindung katalysieren, welche strukturell völlig verschieden vom nativen Substrat des Enzyms ist.

Die aus dem Bakterium *Bacillus megaterium* isolierbare Cytochrom P450-Monooxygenase katalysiert gewöhnlich die subterminale Hydroxylierung langkettiger, gesättigter Säuren und der entsprechenden Amide und Alkohole davon oder die Epoxydation ungesättigter langkettiger Fettsäuren oder gesättigter Fettsäuren mit mittlerer Kettenlänge (11-13). Die optimale Kettenlänge gesättigter Fettsäuren beträgt 14 bis 16 Kohlenstoffatome. Fettsäuren mit einer Kettenlänge von weniger als 12

werden nicht hydroxyliert (11).

Die Struktur der Häm-Domäne von P450 BM-3 wurde durch Röntgen-
strukturanalyse bestimmt (14-16). Die Substratbindungsstelle
5 liegt in Form einer langen tunnelartigen Öffnung vor, welche
von der Moleküloberfläche bis hin zum Häm-Molekül reicht und
wird fast ausschließlich von hydrophoben Aminosäureresten be-
grenzt. Die einzigen geladenen Reste an der Oberfläche der
Häm-Domäne sind die Reste Arg47 und Tyr51. Man nimmt an, daß
10 diese an der Bindung der Carboxylatgruppe des Substrates durch
Bildung einer Wasserstoffbrückenbindung beteiligt sind (14).
Die Mutation von Arg47 zu Glu bewirkt eine Inaktivierung des
Enzyms für Arachidonsäure (13), erhöht jedoch dessen Aktivität
gegenüber C₁₂-C₁₄-Alkyltrimethylammonium-Verbindungen (17). Eine
15 Substratnutzung für aromatische Verbindungen, insbesondere
ein-, zwei- oder mehrkernige, gegebenenfalls heterocyclische,
Aromaten, Alkane, Alkene, Cycloalkane und -alkene, wurde für
dieses Enzym nicht beschrieben. Es wurde deshalb bisher in der
Fachwelt angenommen, daß andere als die bisher beschriebenen
20 organischen Substrate, wie z.B. Indol, aufgrund der deutlichen
strukturellen Unterschiede zu den nativen Substraten von P450
BM-3, insbesondere aufgrund des Fehlens funktioneller Gruppen,
welche an die oben erwähnten Reste in der Substrattasche bin-
den könnten, keine Substrat darstellen.

25 Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung neue Cyto-
chrom P450 Monooxygenasen mit veränderter Substratspezifität
oder verändertem Substratprofil bereit zu stellen. Insbesonde-
re sollten Monooxygenase-Mutanten bereitgestellt werden, welche
30 im Vergleich zu dem nichtmutierten Enzym mit strukturell deut-
lich anderen Substraten enzymatisch aktiv sind.

Diese Aufgabe konnte überraschenderweise gelöst werden durch
neuartige Cytochrom P450 Monooxygenasen, welche z.B. zur Oxi-
35 dation N-heterocyclischer zwei- oder mehrkerniger aromatischer
Verbindungen befähigt sind.

Insbesondere sind Gegenstand der Erfindung solche Monooxygena-

sen, deren Substrat-bindender Bereich durch ortsspezifische Mutagenese zur funktionalen Aufnahme neuer, wie z.B. N-heterocyclischer Substrate, befähigt ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die neuen Monooxygenase löslich, d.h. in nicht-membrangebundener Form existent, und in dieser Form enzymatisch aktiv.

Die erfindungsgemäßen Monooxygenasen sind vorzugsweise abgeleitet von Cytochrom P450 Monooxygenasen bakteriellen Ursprungs, wie insbesondere abgeleitet von Cytochrom P450 Monooxygenase BM-3 aus *Bacillus megaterium* mit einer Aminosäuresequenz gemäß SEQ ID NO:2, welche wenigstens eine funktionelle, d.h. die Oxidation neuer organischer Substrate, wie z.B. N-heterocyclischer zwei- oder mehrkerniger aromatischer Verbindungen, fördernde Mutation, in einem der Aminosäuresequenzbereiche 172-224 (F/Galopp-Bereich), 39-43 (β -strand 1), 48-52 (β -strand 2), 67-70 (β -strand 3), 330-335 (β -strand 5), 352-356 (β -strand 8), 73-82 (helix 5) und 86-88 (helix 6) aufweist.

Die erfindungsgemäß bereitgestellten Cytochrom-P450 Monooxygenase-Mutanten, sind bevorzugt zu wenigstens einer der folgenden Reaktionen befähigt:

- a) Oxidation gegebenenfalls substituierter N-, O- oder S-heterocyclischer ein-, zwei- oder mehrkerniger aromatischer Verbindungen;
- b) Oxidation gegebenenfalls substituierter ein- oder mehrkerniger Aromaten;
- c) Oxidation geradkettiger oder verzweigter Alkane und Alkene; und
- d) Oxidation gegebenenfalls substituierter Cycloalkane und Cycloalkene

Besonders bevorzugten Monooxygenase-Mutanten dieses Typs sind, dadurch gekennzeichnet, daß sie wenigstens eine der folgenden ein- oder mehrfachen Aminosäuresubstitutionen aufweist:

- 1) Phe87Val;
- 2) Phe87Val, Leu188Gln; oder

3) Phe87Val, Leu188Gln, Ala74Gly;
sowie funktionale Äquivalente davon. Der Zahlenwert gibt dabei
die Position der Mutation an; vor dem Zahlenwert steht die
ursprüngliche, hinter dem Zahlenwert die neu eingeführte Ami-
nosäure.

Funktionale Äquivalente oder Analoga der konkret offenbarten
Mutanten sind in diesem Zusammenhang davon verschiedene Mutan-
ten, welche weiterhin die gewünschte Substratspezifität im
Rahmen wenigstens einer der oben bezeichneten Oxidationsreak-
tionen a) bis d), also beispielsweise gegenüber heterozykli-
schen Aromaten, besitzen und z.B. Indol hydroxylieren.

Unter "funktionalen Äquivalenten" versteht man erfindungsgemäß
auch Mutanten, welche in wenigstens einer der oben genannten
Sequenzpositionen eine andere als die konkret genannte Amino-
säuresubstitution aufweisen, aber trotzdem zu einer Mutante
führen, die ebenso wie die konkret genannte Mutante ein gegen-
über dem Wildtypenzym "verändertes Substratprofil" zeigen und
wenigstens eine der oben genannten Oxidationsreaktionen kataly-
sieren. Funktionale Äquivalenz ist insbesondere auch dann
gegeben, wenn die Veränderungen im Reaktivitätsmuster qualita-
tiv übereinstimmen, d.h. beispielsweise gleiche Substrate mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit umgesetzt werden.

"Funktionale Äquivalente" umfassen natürlich auch P450-
Monooxygenase-Mutanten, welche in gleicher Weise wie die kon-
kret genannten P450 BM3-Mutanten durch Mutation von P450-Enzy-
men aus anderen Organismen zugänglich sind. Beispielsweise
lassen sich durch Sequenzvergleich Bereiche homologer Sequenz-
regionen festlegen. Mit den modernen Methoden des Molecular
Modeling können dann in Anlehnung an die konkreten Vorgaben
der Erfindung äquivalente, das Reaktionsmuster beeinflussende
Mutationen vorgenommen werden.

"Funktionale Äquivalente" umfassen ebenso die durch eine oder
mehrere zusätzliche Aminosäure-Additionen, -Substituenten, -
Deletionen und/oder -Inversionen erhältlichen Mutanten, wobei

die genannten zusätzlichen Veränderungen in jeglicher Sequenzposition auftreten können, solange sie zu einer Mutante mit "verändertem Substratprofil" im obigen Sinne führen.

- 5 Erfindungsgemäß ~~oxidierbare Substrate der Gruppe a)~~ sind gegebenenfalls ~~substituierte heterocyclische ein-, zwei- oder mehrkernigen aromatischen Verbindungen;~~ insbesondere oxidierbare oder hydroxylierbare N-, O- oder S-heterocyclische ein-, zwei- oder mehrkernige aromatische Verbindungen. Sie umfassen
- 10 vorzugsweise zwei oder drei, insbesondere zwei, vier- bis siebengliedrige, insbesondere sechs- oder fünfgliedrige, kondensierte Ringe, wobei wenigstens einer, vorzugsweise alle Ringe aromatischen Charakter besitzen und wobei wenigstens einer der aromatischen Ringe ein bis drei, vorzugsweise ein N-, O- oder
- 15 S-Heteroatom im Ring trägt. In der gesamten Ringstruktur können gegebenenfalls ein oder zwei weitere, gleiche oder verschiedene Heteroatome enthalten sein. Die aromatischen Verbindungen können weiterhin 1 bis 5 Substituenten an den Ring-
- 20 Kohlenstoff- oder an den Heteroatomen tragen. Beispiele für geeignete Substituenten sind C₁ bis C₄-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n- oder i-Propyl oder n-, i- oder t-Butyl oder C₂ bis C₄-Alkenyl, wie Ethenyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl oder 3-Butenyl, Hydroxyl und Halogen, wie F, Cl, und Br. Die genannten Alkyl- oder Alkenylsubstituenten können ge-
- 25 gebenfalls auch eine Keto- oder Aldehydgruppe aufweisen; Beispiele hierfür sind Propan-2-on-3-yl, Butan-2-on-4-yl, 3-Buten-2-on-4-yl. Nichtlimitierende Beispiele für geeignete heterocyclische Substrate sind insbesondere zweikernige Heterocyclen, wie Indol, N-Methylindol und die mit ein bis drei
- 30 Substituenten an Kohlenstoffatomen substituierten Analoga davon, wie z.B. 5-Chlor- oder 5-Brom-indol; sowie Chinolin und Chinolinderivate, wie z.B. 8-Methylchinolin, 6-Methylchinolin und Chinaldin; und Benzothiophen und die mit ein bis drei Sub-
- 35 stituenten an Kohlenstoffatomen substituierten Analoga davon. Außerdem seien genannt dreikernige Heteroaromaten wie Acridin und die mit ein bis drei Substituenten an Kohlenstoffatomen substituierten Analoga davon.

Erfindungsgemäß oxidierbare Substrate der Gruppe b) sind gegebenenfalls substituierte ein- oder mehrkernige, insbesondere ein- oder zweikernige Aromaten, wie Benzol und Naphthalin. Die aromatischen Verbindungen können gegebenenfalls ein oder mehrfach substituiert sein und z.B. 1 bis 5 Substituenten an den Ring-Kohlenstoffatomen tragen. Beispiele für geeignete Substituenten sind C₁ bis C₄-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n- oder i-Propyl oder n-, i- oder t- Butyl, oder C₂ bis C₄-Alkenyl, wie Ethenyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl oder 3-Butenyl, Hydroxyl und Halogen, wie F, Cl, und Br. Die genannten Alkyl- oder Alkenylsubstituenten können gegebenenfalls auch eine Keto- oder Aldehydgruppe aufweisen; Beispiele hierfür sind Propan-2-on-3-yl, Butan-2-on-4-yl, 3-Buten-2-on-4-yl. Der Aromat kann gegebenenfalls mit einem vier- bis sieben-gliedrigen, nichtaromatischen Ring kondensiert sein. Der nichtaromatische Ring kann gegebenenfalls eine oder zwei C-C-Doppelbindungen aufweisen, ein- oder mehrfach mit oben genannten Substituenten substituiert sein und gegebenenfalls ein oder zwei Ringheteroatome tragen. Beispiele für besonders brauchbare Aromaten sind einkernige Aromaten, wie Cumol, sowie zweikernige Substrate, wie Inden und Naphthalin, sowie die mit ein bis drei Substituenten an Kohlenstoffatomen substituierten Analoga davon.

Erfindungsgemäß oxidierbare Substrate der Gruppe c) sind geradkettige oder verzweigte Alkane oder Alkene mit 4 bis 15, vorzugsweise 6 bis 12 Kohlenstoffatomen. Als Beispiele können genannt werden n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan-, n-Oktan, n-Nonan, n-Decan, n-Undecan und n-Dodecan, sowie die ein- oder mehrfach verzweigten Analoga dieser Verbindungen, wie z.B. analoge Verbindungen mit 1 bis 3 Methyl-Seitengruppen; oder die ein- oder mehrfach, beispielsweise einfach ungesättigten Analoga der oben genannten Alkane.

Erfindungsgemäß oxidierbare Substrate der Gruppe d) sind gegebenenfalls substituierte Cycloalkane und Cycloalkene. Beispiele hierfür sind Cyclopentan, Cyclopenten, Cyclohexan, Cyclohexen, Cycloheptan und Cyclohepten. Die Ringstruktur kann dabei

ein- oder mehrfach, wie z.B. 1 bis 5 Substituenten gemäß obiger Definition für Verbindungen der Gruppen a) und b) tragen. Nichtlimitierendes Beispiel hierfür sind Ionone, wie α -, β - und γ -Ionon, sowie die entsprechenden Methy lionone und Iso-methy lionone. ~~Besonders bevorzugt sind α - und β -Ionon.~~

Gegenstand der Erfindung sind auch Nukleinsäuresequenzen, kodierend für eine der obigen Monooxygenasen. Bevorzugte Nukleinsäuresequenzen sind abgeleitet von SEQ ID NO:1, welche wenigstens eine Nukleotidsubstitution aufweist, die zu einer der oben beschriebenen funktionellen Aminosäuremutationen führt. Gegenstand der Erfindung sich außerdem durch Addition, Substitution, Insertion oder Deletion einzelner oder mehrerer Nukleotide erhaltenen funktionalen Analoga der Nukleinsäuren, welche weiterhin für eine Monooxygenase mit der gewünschten Substratspezifität, insbesondere mit Indol-oxidierender Aktivität, kodieren.

Erfindungsgemäß umfassen auch solche Nukleinsäuresequenzen, die sogenannte stumme Mutationen umfassen oder entsprechend der Codon-Nutzung eines speziellen Ursprungs- oder Wirtsorganismus, im Vergleich zu einer konkret genannten Sequenz verändert sind, ebenso wie natürlich vorkommende Varianten davon.

Gegenstand der Erfindung sind außerdem Expressionskonstrukte, enthaltend unter der genetischen Kontrolle regulativer Nukleinsäuresequenzen eine für eine erfindungsgemäße Mutante kodierende Nukleinsäuresequenz; sowie Vektoren, umfassend wenigstens eines dieser Expressionskonstrukte.

Vorzugsweise umfassen die erfindungsgemäßen Konstrukte 5'-stromaufwärts von der jeweiligen kodierenden Sequenz einen Promotor und 3'-stromabwärts eine Terminatorsequenz sowie gegebenenfalls weitere übliche regulative Elemente, und zwar jeweils operativ verknüpft mit der kodierenden Sequenz. Unter einer operativen Verknüpfung versteht man die sequentielle Anordnung von Promotor, kodierender Sequenz, Terminator und

gegebenenfalls weiterer regulativer Elemente derart, dass jedes der regulativen Elemente seine Funktion bei der Expression der kodierenden Sequenz bestimmungsgemäß erfüllen kann. Beispiele für operativ verknüpfbare Sequenzen sind Targeting-Sequenzen sowie Translationsverstärker, Enhancer, Polyadenylierungssignale und dergleichen. Weitere regulative Elemente umfassen selektierbare Marker, Amplifikationssignale, Replikationsursprünge und dergleichen.

Zusätzlich zu den artifiziellen Regulationssequenzen kann die natürliche Regulationssequenz vor dem eigentlichen Strukturgen noch vorhanden sein. Durch genetische Veränderung kann diese natürliche Regulation gegebenenfalls ausgeschaltet und die Expression der Gene erhöht oder erniedrigt werden. Das Genkonstrukt kann aber auch einfacher aufgebaut sein, das heißt es werden keine zusätzlichen Regulationssignale vor das Strukturgen insertiert und der natürliche Promotor mit seiner Regulation wird nicht entfernt. Statt dessen wird die natürliche Regulationssequenz so mutiert, dass keine Regulation mehr erfolgt und die Genexpression gesteigert oder verringert wird. Die Nukleinsäuresequenzen können in einer oder mehreren Kopien im Genkonstrukt enthalten sein.

Beispiele für brauchbare Promotoren sind: cos-, tac-, trp-, tet-, trp-tet-, lpp-, lac-, lpp-lac-, lacIq-, T7-, T5-, T3-, gal-, trc-, ara-, SP6-, l-PR- oder im l-PL-Promotor, die vorteilhafterweise in gram-negativen Bakterien Anwendung finden; sowie die gram-positiven Promotoren amy und SPO2, die Hefepromotoren ADC1, MFa, AC, P-60, CYC1, GAPDH oder die Pflanzenpromotoren CaMV/35S, SSU, OCS, lib4, usp, STLS1, B33, nos oder der Ubiquitin- oder Phaseolin-Promotor. Besonders bevorzugt ist die Verwendung induzierbarer Promotoren, wie z.B. licht- und insbesondere temperaturinduzierbarer Promotoren, wie der P_{rP_1} -Promotor.

Prinzipiell können alle natürlichen Promotoren mit ihren Regulationssequenzen verwendet werden. Darüber hinaus können auch synthetische Promotoren vorteilhaft verwendet werden.

Die genannten regulatorischen Sequenzen sollen die gezielte Expression der Nukleinsäuresequenzen und der Proteinexpression ermöglichen. Dies kann beispielsweise je nach Wirtsorganismus bedeuten, dass das Gen erst nach Induktion exprimiert oder
5. überexprimiert wird, oder dass es sofort exprimiert und/oder überexprimiert wird.

Die regulatorischen Sequenzen bzw. Faktoren können dabei vorzugsweise die Expression positiv beeinflussen und dadurch erhöhen oder erniedrigen. So kann eine Verstärkung der regulatorischen Elemente vorteilhafterweise auf der Transkriptionsebene erfolgen, indem starke Transkriptionssignale wie Promotoren und/oder "Enhancer" verwendet werden. Daneben ist aber auch eine Verstärkung der Translation möglich, indem beispielsweise die Stabilität der mRNA verbessert wird.
10
15

Die Herstellung einer Expressionskassette erfolgt durch Fusion eines geeigneten Promotors mit einer geeigneten Monooxygenase-Nukleotidsequenz sowie einem Terminator oder Polyadenylierungssignal. Dazu verwendet man gängige Rekombinations- und Klonierungstechniken, wie sie beispielsweise in T. Maniatis, E.F. Fritsch und J. Sambrook, "Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1989) sowie in T.J. Silhavy, M.L. Berman und L.W. Enquist, Experiments with Gene Fusions, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1984) und in Ausubel, F.M. et al., Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing Assoc. and Wiley Interscience (1987) beschrieben sind.
20
25

Das rekombinante Nukleinsäurekonstrukt bzw. Genkonstrukt wird zur Expression in einem geeigneten Wirtsorganismus vorteilhafterweise in einen wirtsspezifischen Vektor insertiert, der eine optimale Expression der Gene im Wirt ermöglicht. Vektoren sind dem Fachmann wohl bekannt und können beispielsweise aus
30
35 "Cloning Vectors" (Pouwels P. H. et al., Hrsg, Elsevier, Amsterdam-New York-Oxford, 1985) entnommen werden. Unter Vektoren sind außer Plasmiden auch alle anderen dem Fachmann bekannten Vektoren, wie beispielsweise Phagen, Viren, wie SV40,

CMV, Baculovirus und Adenovirus, Transposons, IS-Elemente, Phasmide, Cosmide, und lineare oder zirkuläre DNA zu verstehen. Diese Vektoren können autonom im Wirtsorganismus repliziert oder chromosomal repliziert werden.

5.

Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vektoren sind rekombinante Mikroorganismen herstellbar, welche beispielsweise mit wenigstens einem erfindungsgemäßen Vektor transformiert sind und zur Produktion der Mutanten eingesetzt werden können. Vorteilhafterweise werden die oben beschriebenen erfindungsgemäßen rekombinanten Konstrukte in ein geeignetes Wirtssystem eingebracht und exprimiert. Dabei werden vorzugsweise dem Fachmann bekannte geläufige Klonierungs- und Transfektionsmethoden verwendet, um die genannten Nukleinsäuren im jeweiligen Expressionssystem zur Expression zu bringen. Geeignete Systeme werden beispielsweise in Current Protocols in Molecular Biology, F. Ausubel et al., Hrsg., Wiley-Interscience, New York 1997, beschrieben.

15

Als Wirtsorganismen sind prinzipiell alle Organismen geeignet, die eine Expression der erfindungsgemäßen Nukleinsäuren, ihrer Allelvarianten, ihrer funktionellen Äquivalente oder Derivate ermöglichen. Unter Wirtsorganismen sind beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, pflanzliche oder tierische Zellen zu verstehen. Bevorzugte Organismen sind Bakterien, wie solche der Gattungen Escherichia, wie z. B. Escherichia coli, Streptomyces, Bacillus oder Pseudomonas, eukaryotische Mikroorganismen, wie Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, höhere eukaryotische Zellen aus Tieren oder Pflanzen, beispielsweise Sf9 oder CHO-Zellen.

25

Gewünschtenfalls kann das Genprodukt auch in transgenen Organismen wie transgenen Tieren, wie insbesondere Mäusen, Schafen oder transgenen Pflanzen zur Expression gebracht werden. Bei den transgenen Organismen kann es sich auch um sogenannte Knock-Out Tiere oder Pflanzen handeln, in denen das korrespondierende endogene Gen ausgeschaltet wurde, wie z. B. durch Mutation oder partielle oder vollständige Deletion.

30

35

Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur mikrobiologischen Oxidation N-heterocyclischer zwei- oder mehrkerniger aromatischer Verbindungen gemäß obiger Definition, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man

- a1) ~~einen rekombinanten Mikroorganismus gemäß obiger Definition in einem Kulturmedium in Gegenwart eines~~ exogenen (von außen zugesetzten) oder intermediär gebildeten Substrats, vorzugsweise in Gegenwart von Sauerstoff, kultiviert; oder
- a2) ein Substrat-haltiges Reaktionsmedium mit einem erfindungsgemäßen Enzym, vorzugsweise in Gegenwart von Sauerstoff und einem Elektronendonator, inkubiert; und
- b) das gebildete Oxidationsprodukt oder ein Folgeprodukt davon aus dem Medium isoliert.

Bevorzugt ist das ~~exogene oder intermediär gebildete~~ Substrat ausgewählt unter

- a) ~~gegebenenfalls substituierten N-heterocyclischen~~ ein-, zwei- oder mehrkernigen aromatischen Verbindungen;
- b) ~~gegebenenfalls substituierten~~ ein- oder mehrkernigen Aromaten;
- c) geradkettigen oder verzweigten Alkanen und Alkenen;
- d) gegebenenfalls substituierten Cycloalkanen und Cycloalkenen.

Eine bevorzugte Verfahrensvariante ist auf die Bildung von Indol/Indirubin gerichtet und dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat ~~intermediär gebildetes Indol ist und man aus dem Medium das anfallende Indigo und/oder Indirubin isoliert, welches durch Oxidation von intermediär gebildetem Indol erzeugt wurde.~~

Wird die Umsetzung mit einem rekombinanten Mikroorganismus durchgeführt, so erfolgt vorzugsweise zunächst die Kultivierung der Mikroorganismen in Gegenwart von Sauerstoff und in einem Komplexmedium, wie z.B. TB- oder LB- Medium bei einer

Kultivierungstemperatur von etwa 20 bis 40 °C und einem pH-Wert von etwa 6 bis 9, bis eine ausreichende Zelldichte erreicht ist. Die Zugabe von Indol ist gewöhnlich nicht erforderlich, da dieses vom Mikroorganismus intermediär gebildet wird. Um die Oxidationsreaktion besser steuern zu können, bevorzugt man die Verwendung eines induzierbaren, insbesondere temperaturinduzierbaren, Promotors. Man erhöht dabei die Temperatur auf die erforderliche Induktionstemperatur, z.B. 42 °C beim P₁P₁-Promotor, behält dies über einen ausreichenden Zeitraum, z. B. 1 bis 10 oder 5 bis 6 Stunden, zur Expression der Monooxygenase-Aktivität bei und verringert anschließend der Temperatur wieder einen Wert von etwa 30 bis 40 °C. Die Kultivierung wird dann in Gegenwart von Sauerstoff 12 Stunden bis 3 Tage fortgesetzt. Der pH-Wert kann dabei durch Zugabe von NaOH, z.B. auf 9 bis 10, erhöht werden, wodurch die Indigobildung bzw. Indirubinbildung durch Luftoxidation der enzymatisch gebildeten Oxidationsprodukte 2- und 3-Hydroxyindol zusätzlich gefördert wird.

Wird die erfindungsgemäße Umsetzung (Mono- und/oder Di-Hydroxylierung) dagegen mit gereinigtem oder angereichertem Enzym durchgeführt so löst man das erfindungsgemäße Enzym in einem exogenes Substrat enthaltenden, wie z.B. Indol enthaltenden, Medium (etwa 0,01 bis 10 mM, oder 0,05 bis 5 mM), und führt die Umsetzung, vorzugsweise in Gegenwart von Sauerstoff, bei einer Temperatur von etwa 10 bis 50 °C, wie z.B. 30 bis 40 °C, und einem pH-Wert von etwa 6 bis 9 (wie z.B. eingestellt mit 100 bis 200 mM Phosphat- oder Tris-Puffer), sowie in Gegenwart eines Reduktionsmittels durch, wobei das Substrat-haltige Medium außerdem bezogen auf das zu oxidierende Substrat einen etwa 10-bis 100-fachen molaren Überschuß an Reduktionsäquivalenten enthält. Bevorzugtes Reduktionsmittel ist NADPH.

Beim erfindungsgemäßen Substratoxidationsprozess wird im Reaktionsmedium enthaltener oder zugesetzter Sauerstoff reduktiv enzymatisch gespalten. Die erforderlichen Reduktionsäquivalente werden von dem zugesetzten Reduktionsmittel (Elektronendonator) zur Verfügung gestellt.

Das gebildete Oxidationsprodukt kann dann in herkömmlicher Weise, wie z.B. durch Extraktion oder Chromatographie, vom Medium abgetrennt und gereinigt werden.

5 Weitere Gegenstände der Erfindung betreffen Bioreaktoren, umfassend ein erfindungsgemäßes Enzym oder einen erfindungsgemäßen rekombinanten Mikroorganismus in immobilisierter Form.

10 Ein letzter Gegenstand der Erfindung betrifft die Verwendung einer erfindungsgemäßen Cytochrom P450 Monooxygenase oder eines erfindungsgemäßen Vektors oder Mikroorganismus zur mikrobiologischen Oxidation eines Substrates aus einer der Gruppen a) bis d), insbesondere N-heterocyclischer zwei- oder mehrkerniger aromatischer Verbindungen, und bevorzugt zur Bildung von
15 Indigo und/oder Indirubin.

Die vorliegende Erfindung wird nunmehr unter Bezugnahme auf die folgenden Beispiele näher beschrieben.

20 Beispiel 1:

Randomisierung spezieller Codons von P450 BM-3

25 Die Versuche wurden im wesentlichen wie beschrieben in (19) durchgeführt. Drei Positionen (Phe87, Leu188 und Ala74) wurden mit Hilfe von ortsspezifischer Mutagenese unter Verwendung des Stratagene QuikChange kit (La Jolla, CA, USA) randomisiert. Folgende PCR-Primer wurden für die einzelnen Positionen verwendet: Phe87: 5'-gcaggagacgggttgnnnacaagctggacg-3' (SEQ ID
30 NO:3), 5'-cgtccagcttgtnnneaaccgtctcctgc-3', (SEQ ID NO:4)
Leu188: 5'-gaagcaatgaacaagnnncagcgagcaaatccag-3' (SEQ ID NO:5), 5'-actggatttgctcgctgtnncttggtteattgcttc-3' (SEQ ID NO:6;
Ala74: 5'-gctttgataaaaacttaagteaannncttaaatgttacg-3' (SEQ ID NO:7, 5'-cgtacaaatttaagnnnttgacttaagtttttatcaaagc-3' (SEQ ID
35 NO:8)

Die Bedingungen für die PCR waren für alle drei Positionen identisch. Insbesondere wurden je 50 µl Reaktionsvolumen 17,5

pmol eines jeden Primers, 20 pmol Template-Plasmid-DNA, 3 U der Pfu Polymerase und 3,25 nmol von jedem dNTP verwendet. Die PCR Reaktion wurde bei 94°C /1 min gestartet und dann wurde folgender Temperaturzyklus 20 mal durchgeführt: 94°C, 1 min; 46°C, 2,5 min; 72°C, 17 min. Nach 20 Zyklen wurde die Reaktion 15 min bei 72°C fortgesetzt. Nach der PCR wurde die Template DNA mit 20 U DpnI bei 37°C 3 h verdaut. Anschließend wurde *E. coli* DH5 α transformiert. Die transformierten *E. coli* DH5 α -Zellen wurden auf LB-Agarplatten ausplattiert, welche 150 μ g/ml Ampicillin enthielten. Anschließend wurde 18 h bei 37°C inkubiert.

Beispiel 2:

Expression und Reinigung der P450 BM-3 und dessen Mutanten und Produktion eines blauen Pigmentes

Das P450 BM-3-Gen und die Mutanten davon wurden unter der Kontrolle des starken, Temperatur-induzierbaren P_{RPL} -Promotors des Plasmids pCYTEXP1 in *E. coli* DH5 α wie bereits beschrieben (20), exprimiert. Kolonien wurden mit sterilen Zahnstochern aufgenommen und in Mikrotiterplatten mit 96 Vertiefungen, enthaltend je Vertiefung 200 μ l TB-Medium und 100 μ g/ml Ampicillin transferiert. Anschließend wurde über Nacht bei 37°C inkubiert. 40 μ l der Zellkultur einer jeden Vertiefung wurden anschließend in ein Kulturröhrchen überführt, das 2 ml TB-Medium mit 100 μ g/ml Ampicillin enthält. Anschließend wurde 2 h bei 37°C kultiviert. Dann wurde die Tempertur zur Induktion 6 h auf 42°C erhöht. Dann wurde die Kultivierung über Nacht bei 37°C fortgesetzt, wobei ein blaues Pigment produziert wurde.

Die präparative Herstellung von Enzym oder blauem Pigment wurde ausgehend von einer 300 ml Zellkultur (OD_{578nm} = 0,8 bis 1,0) durchgeführt. Zur Isolierung des Enzymes wurden die Zellen 10 min bei 4000 Upm abzentrifugiert, in 0,1 M K_xPO_4 -Puffer, pH 7,4 resuspendiert. Die eisgekühlten Zellen wurden mit Hilfe eines Branson Sonifiers W25 (Dietzenbach, Deutschland) bei einer Energieoutput von 80 W durch dreimalige Beschallung von 2 min

vorsichtig aufgeschlossen. Die Suspensionen wurden 20 min bei 32570 x g zentrifugiert. Der Rohextrakt wurde zur Aktivitätsbestimmung bzw. zur Enzymreinigung eingesetzt. Die Enzymreinigung erfolgte wie in (21) bereits beschrieben, worauf hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird. Die Konzentration an gereinigtem Enzym wurde über die Extinktionsdifferenz bei 450 und 490 nm, wie in (11) bereits beschrieben, unter Verwendung eines Extinktionskoeffizienten ϵ von $91 \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ bestimmt.

10 Beispiel 3:

Isolierung von Mutanten, welche große Mengen an blauem Pigment produzieren

15 Jeweils 100 Kolonien wurden von den Mutanten einer jeden Position isoliert, welche durch randomisierte Mutagenese des Codons der entsprechenden Position erzeugt wurden. Diese Kolonien wurden in Kulturröhrchen zur Produktion von blauem Pigment kultiviert. Nach dem Waschen der Zellen mit Wasser und
20 mehreren langsamen Zentrifugationsschritten (500 g) wurde das blaue Pigment mit Dimethylsulfoxid (DMSO) extrahiert. Die Löslichkeit des blauen Pigmentes war in DMSO am größten. Die Absorption des Extraktes wurde bei 677 nm bestimmt. Diejenige Mutante, welche die größte Menge an blauem Pigment von allen
25 Mutanten einer bestimmten Position produzierte, wurde für eine DNA-Sequenzierung (ABI DNA Sequenzierungs-Kit; ABI Prism™ 377 DNA Sequencer) verwendet und außerdem als Template für ortsspezifische randomisierte Mutagenese verwendet.

30 Beispiel 4:

Aktivitätstest für die Indol-Hydroxylierung

35 Die Indol-Hydroxylierungsaktivität wurde in einer Lösung getestet, die 8 μl einer 10-500 mM Indollösung in DMSO, 850 μl Tris/HCl-Puffer (0,1 M, pH 8,2) und 0,6 nmol P450 BM-3 Wildtyp oder Mutante in einem Endvolumen von 1 ml enthielt. Das Gemisch wurde 9 min vorinkubiert, bevor man die Reaktion durch

Zugabe von 50 μ l einer wässrigen 1 mM Lösung von NADPH startete. Die Reaktion wurde nach 20 sec durch Zugabe von 60 μ l 1,2 M KOH gestoppt. Innerhalb von 5 bis 30 sec (unter aeroben Bedingungen) wurden die Enzymprodukte vollständig in Indigo [$\Delta^{2,2'}$ -Biindolin]-3,3'-dion) und Indirubin ([$\Delta^{2,3'}$ -Biindolin]-2',3-dion) überführt. Die Indigoproduktion wurde über dessen Absorption bei 670 nm bestimmt. Eine Eichkurve mit reinem Indigo zeigte einen Extinktionskoeffizienten von $3,9 \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ bei dieser Wellenlänge. Ein linearer Kurvenverlauf wurde für die Indigoproduktion in einer Reaktionszeit von 40 sec unter Verwendung von 0,6 nmol Wildtyp bzw. P450 BM-3-Mutante und 0,05 bis 5,0 mM Indol erhalten. Indirubin zeigt eine sehr schwache Absorption bei 670 nm und die gebildete Indirubinmenge war sehr viel geringer als die gebildete Indigomenge. Die Bildung von Indirubin wurde bei der Bestimmung der kinetischen Parameter vernachlässigt. Der NADPH-Verbrauch wurde bei 340 nm bestimmt und unter Verwendung eines Extinktionskoeffizienten von $6,2 \text{ mM}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ wie beschrieben (17) berechnet.

20 Beispiel 5:

Reinigung von Indigo und Indirubin

25 Nach Waschen der Zellen mit Wasser und wiederholter Zentrifugation bei 500 g wurde das gebildete blaue Pellet mit Tetrahydrofuran (THF) extrahiert. Der Extrakt wurde bis fast zur Trockene eingedampft und das rote Pigment wurde mehrmals mit 50 ml absolutem Ethanol extrahiert. Der verbleibende blaue Feststoff wurde in THF gelöst und durch Dünnschichtchromatographie (TLC) analysiert. Die Ethanollösung wurde eingedampft und durch Silicagelchromatographie (DC 60, Merck, Darmstadt, Deutschland; 2 cm x 30 cm) gereinigt, bevor sie mit THF und Petrolether in einem Verhältnis von 1:2 gewaschen wurde. Die erhaltene rote Lösung wurde eingedampft und deren Reinheit wurde durch TLC bestimmt. Die Absorptionsspektren des blauen und des roten Pigmentes wurden mit Hilfe eines Ultraspec 3000 Spektrophotometers (Pharmacia, Uppsala, Sweden) in einem Bereich von 400 bis 800 nm bestimmt. Außerdem wurde der blaue

und der rote Farbstoff durch Massenspektrometrie und ^1H -NMR Spektroskopie analysiert.

Versuchsergebnisse

1. Erhöhung der Produktivität für blaues Pigment durch P450 BM-3-Mutagenese

Natives P450 BM-3 besitzt nicht die Fähigkeit zur Produktion des blauen Indigo-enthaltenden Pigments, bzw. der Vorläufersubstanten 2- bzw 3-Hydroxyindol. Um eine ausreichende Menge an blauem Pigment herstellen zu können, wurde P450 BM3 einer gezielten Evolution ausgesetzt. Sämtliche Mutanten, welche das blaue Pigment produzierten, wurden sequenziert. Es wurde festgestellt, daß wenigstens eine der folgenden drei Positionen mutiert waren: Phe87, Leu188 und Ala74. Es wurde deshalb angenommen, daß diese drei Positionen eine entscheidende Rolle für die Aktivität von P450 BM-3 bei der Produktion von blauem Pigment spielen. Aus der Struktur der Häm-Domäne von Cytochrom P450 BM-3, komplexiert mit Palmitoleinsäure sieht man, daß Phe87 das Substrat an einem näheren Heranrücken an die Häm-Gruppe hindert (14). Die Mutante Phe87Val zeigt eine hohe Regio- und Stereoselektivität bei der Epoxidation von (14S, 15R)-Arachidonsäure (13) und die Mutante Phe87Ala verschiebt die Hydroxylierungsposition von ω -1, ω -2 und ω -3 zu ω (22). Die Position 87 wurde deshalb als erste für die ortsspezifische randomisierte Mutagenese mit Hilfe von PCR ausgewählt. In Röhchenkulturen wurden 7 Kolonien erhalten, welche eine geringe Menge an blauem Pigment nach Induktion produzierten. Die Kolonie, welche die größte Menge des blauen Pigments produzierte, wurde für die DNA-Sequenzierung ausgewählt. Die Sequenzdaten ergaben eine Substitution von Phe87 durch Val. Die Mutante Phe87Val wurde anschließend als Template für die zweite Runde der ortsspezifischen randomisierten Mutagenese an Position Leu188 verwendet. Die Struktur der Häm-Domäne, komplexiert mit Palmitoleinsäure zeigt, daß die Repositionierung der F- und G-Helices den Rest Leu188 in direkten Kontakt mit dem Substrat bringt (14). Diese Position könnte deshalb eine wichtige Rolle

bei der Substratbindung oder -orientierung spielen. Nach dem zweiten Screeningdurchgang wurden 31 Kolonien beobachtet, welche das blaue Pigment produzierten. Die Mutante, welche die größte Pigmentmenge produzierte, enthielt die Substitutionen Phe87Val und Leu188Gln. Diese Mutante wurde anschließend in Position Ala74 im dritten Durchgang der ortspezifischen randomisierten Mutagenese mutiert. Man erhielt dabei die Dreifachmutante F87L188A74 (Phe87Val, Leu188Gln und Ala74Gly), welche mehrere mg blaues Pigment in einem 2-Liter-Kolben, enthaltend 300 ml TB-Medium, produzierte. Diese Menge reichte zur Isolierung und Charakterisierung des blauen Pigmentes aus.

2. Isolierung und Identifizierung des blauen Pigments

Nach dem Auswaschen der Zellen wurde das verbleibende blaue Pellet mit THF extrahiert und TLC analysiert. Das blaue Pigment wurde in eine schneller wandernde blaue Komponente und in eine langsamer wandernde rote Komponente aufgetrennt. Beide Komponenten zeigten exakt die gleichen Mobilitätsparameter wie die Komponenten einer kommerziellen Indigo-Probe.

Nach der Reinigung wurden die Absorptionsspektren beider Komponenten in DMSO bestimmt. Die blaue Komponente zeigte das gleiche Spektrum wie eine kommerzielle Indigoprobe. Die gereinigte blaue und rote Komponente wurden jeweils durch Massenspektrometrie analysiert. Die Massenspektren beider Pigmente zeigten einen starken Moleküllionenpeak bei $m/z = 262$ und zwei Fragmentenpeaks bei $m/z = 234$ und 205 (relative Intensität jeweils 10%). Dieses Muster ist typisch für indigoide Verbindungen.

Die Elementarzusammensetzung dieser Ionen wurde durch hochauflösende Massenspektrometrie bestimmt als $C_{16}H_{10}N_2O_2$, $C_{15}H_{10}N_2O$ bzw. $C_{14}H_9N_2$. Dies ist ebenfalls charakteristisch für Strukturen vom Indigotyp. Das blaue Pigment wurde somit als Indigo und das rote Pigment als Indirubin bestimmt. Zur Bestätigung der Struktur wurden 500 MHz 1H -NMR-Spektren beider Pigmente in DMSO- D_6 -Lösung durchgeführt. Die Ergebnisse stimmten mit den Literaturangaben (23) überein.

3. Produktion von Indigo mit isolierten Enzymen

Es ist bekannt, daß Indigo aus Indol durch mikrobielle Transformation zugänglich ist (24,26). Keines dieser mikrobiellen Systemen enthält jedoch eine P450-Monooxygenase. Erfindungsgemäß wurde zunächst die katalytische Aktivität des reinen Enzyms für Indol bestimmt. Die Mutante F87L188A74 wurde mit Indol vermischt. Keine Farbreaktion war zu beobachten. Erst nach Zugabe von NADPH zum Reaktionsgemisch bildete sich das blaue Pigment nach etwa 20 min. Durch Einstellung des pH-Werts der Reaktionsmischung auf einen Wert von etwa 11, 30 sec nach Zugabe von NADPH, wurde die blaue Färbung innerhalb von wenigen Sekunden sichtbar. Kontrollversuche unter Verwendung von nativem P450 BM-3 waren immer negativ, selbst unter Verwendung erhöhter Konzentrationen an Enzym, Indol und NADPH. Das blaue Pigment wurde mit Ethylacetat extrahiert und durch TLC analysiert. Das blaue Pigment trennte sich wieder in eine schneller laufende blaue Komponente und in eine langsamer laufende rote Komponente auf. Die R_f-Werte und die Absorptionsspektren waren identisch mit denjenigen Werten der Extrakte aus der Fermentationsbrühe. Die F87L188A74-Mutante von P450 BM-3 stellt somit eine Indolhydroxylase dar.

Es sind bisher zwei Wege für die enzymatische Transformation von Indol zu Indigo beschrieben worden. Ein Weg wird durch eine Dioxygenase, der andere durch eine Styrolmonooxygenase katalysiert (24,25). Die NADPH-Stöchiometrie beträgt in beiden Fällen 2. Es wurde deshalb angenommen, daß im Gegensatz zu den Dioxygenasen die erfindungsgemäße Mutante F87L188A74 Indol in nur einer Position hydroxyliert, um Oxindol (2-Hydroxyindol) oder Indoxyl (3-Hydroxyindol) zu bilden.

4. Kinetische Parameter der Indolhydroxylierung

Reine Proben des Wildtyp-Enzyms P450 BM-3 und der Mutanten Leu188Gln, Phe87Val, F87L188 und F87L188A74 wurden zur Bestimmung der kinetischen Parameter der Indolhydroxylierung verwendet. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle 1 zusammenge-

faßt.

Tabelle 1 Kinetische Parameter der P450 BM-3 Mutanten für Indolhydroxylierung

| Mutanten | K_{cat} (S^{-1}) | K_m (mM) | K_{cat}/K_m ($M^{-1}s^{-1}$) |
|------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| WT | - ^{a)} | - | - |
| Leu188Gln | n.d. ^{b)} | n.d. | n.d. |
| Phe87Val | 2,03 (0,14) | 17,0 (1,0) | 119 |
| F87L188 | 2,28 (0,16) | 4,2 (0,4) | 543 |
| F87L188A74 | 2,73 (0,16) | 2,0 (0,2) | 1365 |

^{a)} keine Aktivität wurde beobachtet;

^{b)} nicht bestimmt (Aktivität war zu gering um gemessen zu werden)

Selbst beim Überschuß an gereinigtem Enzym und hoher Indolkonzentration ist das Wildtyp-Enzym nicht in der Lage, Indol zu oxidieren. Die Mutante Leu188Gln zeigt eine geringe Aktivität. Die Mutante Phe87Val zeigt eine katalytische Wirksamkeit von $119 M^{-1}s^{-1}$ für die Indolhydroxylierung. Die katalytische Effizienz der Doppelmutante F87L188 (Phe87Val, Leu188Gln) erhöhte sich auf $543 M^{-1}s^{-1}$ und wurde durch Einführung der weiteren Substitution Ala74Gly auf $1365 M^{-1}s^{-1}$ erhöht. Die K_{cat} -Werte erhöhten sich von Phe87Val zur Dreifachmutante hin um insgesamt 35%, während die K_m -Werte etwa um das Siebenfache abnahmen. Dies weist darauf hin, daß Ala74Gly und Leu188Gln vorwiegend an der Substatbindung beteiligt sind.

Die Indol-Turnover-Rate ($K_{cat}=2,73 s^{-1}$) war für die Dreifachmutante F87L188A74 mehr als zehnfach höher als für die meisten P450-Enzyme (18).

Beispiel 6:n-Oktanhydroxylierung mit modifizierter Cytochrom P450 Mono-oxygenase

5

Die Umsetzungen wurden mit einer P450_{BM-3} Monooxygenase Mutante durchgeführt, die folgende Mutationen enthält: Phe87Val Leu188Gln Ala74Gly

10

Als Substrat wurde n-Octan gewählt. Für die Hydroxylierung des n-Octans wurde folgender aerober Reaktionsansatz verwendet:

P450 BM-3 Mutante: 17,5 mg

Reaktionspuffer: 9,1 ml (Kaliumphosphat-Puffer 50 mM, pH 7.5)

15

Substrat: 50 µl einer 60 mM Lösung (in Aceton)

Temperatur: 25°C

20

Enzymlyophilisat wurde in 500 µl Reaktionspuffer gelöst und zunächst mit Substrat und Reaktionspuffer 5 min bei Raumtemperatur inkubiert. Anschließend erfolgte die Zugabe von 300 µl

NADPH-Lösung (5 mg/ml). Die NADPH-Zugabe wurde noch zweimal wiederholt. Der Reaktionsverlauf wurde durch Absorptionsmessungen bei 340 nm verfolgt, wobei die NADPH Abnahme beobachtet werden kann. NADPH wird dabei in 300 µl-Schritten zugegeben,

25

da eine zu hohe Konzentration an NADPH in der Reaktionslösung zu einer Inaktivierung des Enzyms führt. Zur Isolierung der Produkte wurde anschließend die Reaktionslösung 3 mal mit 5 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden über MgSO₄ getrocknet und eingeeengt. Anschließend wurden die Produkte über DC, GC/MS und NMR charakterisiert.

30

Die GC/MS-Analyse des Reaktionsgemisches führte zu folgendem Ergebnis:

| Verbindung | Rt [min] ¹⁾ | Umsatz [%] |
|------------|------------------------|------------|
| 4-Octanol | 13.51 | 37 |
| 3-Octanol | 14.08 | 47 |
| 2-Octanol | 14.26 | 16 |

¹⁾ Temperaturprogramm: 40°C 1min isotherm / 3°C/min 95°C / 10°C/min 275°C; Apparatur: Finnigan MAT 95; GC: HP 5890 Series II Split Injector; Säule: HP-5MS (Methylsiloxan) 30m x 0.25mm; Trägergas: 0,065 ml/min He

Edukt wurde nicht mehr gefunden.

Beispiel 7:

Hydroxylierung von Aromaten, Heteroaromaten und Trimethylcyclohexenylverbindungen

- a) Beispiel 6 wurde wiederholt, wobei jedoch anstelle von n-Oktan als Substrat Naphthalin eingesetzt wurde. Als Produkte wurden 1-Naphthol und cis-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalin identifiziert. Vom eingesetzten Naphthalin wurden 88% umgesetzt.

Analytik für Umsetzungen mit Naphthalin

GC:

Apparatur: Carlo Erba Strumentazion Typ HRGC 4160 on Column Injector; Säule: DB5 30m x 0,2 mm; Material: 5%

Diphenyl- 95% Dimethylpolysiloxan; Trägergas: 0,5 bar H₂; Temperaturprogramm: 40°C 1 min isotherm / 10°C/min bis 300°C

Rt (1-Naphthol) = 16.68

NMR:

Im ¹H-NMR konnte 1-Naphthol und cis-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalin identifiziert werden.

b) Beispiel 6 wurde wiederholt, wobei jedoch anstelle von n-Oktan als Substrat 8-Methylchinolin eingesetzt wurde. Als Hauptprodukt wurde 5-Hydroxy-8-methylchinolin neben weiteren Derivaten (Produktverhältnis 5:1) identifiziert. Vom eingesetzten Edukt wurden 35% umgesetzt.

c) ~~Beispiel 6 wurde wiederholt, wobei jedoch anstelle von n-~~
Oktan als Substrat α -Ionon eingesetzt wurde. Als Haupt-
produkt wurde 3-Hydroxy- α -ionon neben weiteren Derivaten
(Produktverhältnis 76:24) identifiziert. Vom eingesetzten
Edukt wurden 60% umgesetzt.

d) Beispiel 6 wurde wiederholt, wobei jedoch anstelle von n-
Oktan als Substrat Cumol (i-Propylbenzol) eingesetzt wur-
de. Es wurden fünf Monohydroxyprodukte und ein Dihydrox-
yprodukt identifiziert. Vom eingesetzten Edukt wurden 70%
umgesetzt.

LITERATUR

1. Yano, T., Oue, S., and Kagamiyama, H. (1998) Proc. Natl. Acad Sci. USA 95, 5511-5515.
2. Zhang, J.-H., Dawes, G., and Stemmer, W. P. C. (1997) Proc. Natl. Acad Sci. USA 94, 4504-4509.
3. Wan, L., Twitchett, M. B., Eltis, L. D., Mauk, A. G., and Smith, M. (1998) Proc. Natl. Acad Sci USA 95, 12825-12831.
4. Cronin, C. N. (1998) J. Biol. Chem 273, 24465-24469.
5. Wilks, H. M., Hart, K- W., Feeney, R., Dunn, C. R., Muirhead, H., Chia, W. N., Barstow, D. A., Atkinson, T., Clarke, A. R., Holbrook, I J. (1988) Science 242, 1541-1544.
6. Hedstrom, L., Szilagyi, L., Rutter, W. J. (1992) Science 255, 1249-1253.
7. Tucker, C. L., Hurley, J. H., Miller, T. R., and Hurley, I B. (1998) Proc. Natl. Acad Sci. USA 95, 5993-5997.
8. Quemeneur, E., Moutiez, J.-B. C., and Menez, A. (1998) Nature (London) 391, 301-303.
9. Marsden, A- F. A., Wilkinson, B., Cortes, J., Dunster, N. J., Staunton, I Leadlay, P. F. (1998) Science 279, 199-201.
10. Chen, R., Greer, A., and Dean, A. M. (1998) Proc. Natl. Acad Sci. US4 95, 11666-11670.
11. Boddupalli, S. S., Estabrook, R. W. and Peterson, J. A. (1990) J Biol. Chem 265, 4233-4239.
12. Capdevila, J. H., Wie, S., Helvig, C., Falck, J. R., Be-

losludtsev, Y., Truan, G., Graham-Lorence, S. E., and Peterson, J. A. (1996) J. Biol. Chem 271, 22663-22671.

13. Graham-Lorence, S., Truan, G., Peterson, J. A., Flack, J. R., Wells, S., Helvig, C., Capdevilla, J. H. (1997) J. Biol. Chem 272, 1127-1135.

14. Li, H., Poulos, T. L. (1997) Nat. Structural Biol., 4, 140-146.

15. Ravichandran, K G., Sekhar, S., Boddupalli, S., Hasemann, C. A., Peterson, J. A., Deisenhofer, J. (1993) Science 261, 731-736.

16. Modi S., Sutcliffe, M. J., Primrose, W. U., Lian, L.- Y., Roberts, G. C. K (1996) Nat. Structural Biol. 3, 414-417.

17. Oliver, C.F., Modi S., Primrose, W.U., Lian, L.Y. and Roberts, G.C.K. (1997) Biochem. J. 327, 537-544.

18. Guengerich, F.G. (1991) J. Biol. Chem 266, 10019-10022.

19. Cherry, J. R., Lamsa, M. H., Schneider, P., Vind, J., Svendsen, A., Jones, A., and Pedersen, A. H. (1999) Nature Biotechnology 17, 379-384.

20. Schwaneberg, U., Schmidt-Dannert, C., Schmitt, J., and Schmid, R. D. (1999) Anal Biochem. 269, 359-366.

21. Schwaneberg, U., Sprauer, A., Schmidt-Dannert, C., and Schmid, R. D. J of Chromatogr. A, in press.

22. Oliver, C.F., Modi, S., Sutcliffe, M.J., Primrose, W.U., Lian, L.Y. and Roberts, G.C.K (1997) Biochemistry 36, 1567-1572.

23. Hart, S., Koch, K.R., and Woods, D.R. (1992) J Gen. Microbiol. 138, 211-216

24. Murdock, D., Ensley, B.D., Serdar, C. and Thalen, M.
(1993) Bio/Technology 11, 381-385.
25. O'Connor, ICE., Dobson, A-W. and Hartmans, S. (1997)
Appl. Environ. Microbiol. 63, 4287-4291.
26. Eaton, R. W. and Chapman, P. J. (1995) J Bacteriol. 177,
6983-6988.

SEQUENZPROTOKOLL

<110> BASF Aktiengesellschaft

<120> Neue Cytochrom P450 Monooxygenasen und deren Verwendung
zur Oxidation von organischen Verbindungen

<130> M/41148

<140>

<141>

<160> 9

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 3150

<212> DNA

<213> Bacillus megaterium

<220>

<221> CDS

<222> (4)..(3150)

<400> 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| atg | aca | att | aaa | gaa | atg | cct | cag | cca | aaa | acg | ttt | gga | gag | ctt | aaa | 48 |
| Thr | Ile | Lys | Glu | Met | Pro | Gln | Pro | Lys | Thr | Phe | Gly | Glu | Leu | Lys | | |
| 1 | | | | 5 | | | | | 10 | | | | | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| aat | tta | ccg | tta | tta | aac | aca | gat | aaa | ccg | gtt | caa | gct | ttg | atg | aaa | 96 |
| Asn | Leu | Pro | Leu | Leu | Asn | Thr | Asp | Lys | Pro | Val | Gln | Ala | Leu | Met | Lys | |
| | | | 20 | | | | | | 25 | | | | | 30 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| att | gcg | gat | gaa | tta | gga | gaa | atc | ttt | aaa | ttc | gag | gcg | cct | ggg | cgt | 144 |
| Ile | Ala | Asp | Glu | Leu | Gly | Glu | Ile | Phe | Lys | Phe | Glu | Ala | Pro | Gly | Arg | |
| | | | 35 | | | | | 40 | | | | | | 45 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| gta | acg | cgc | tac | tta | tca | agt | cag | cgt | cta | att | aaa | gaa | gca | tgc | gat | 192 |
| Val | Thr | Arg | Tyr | Leu | Ser | Ser | Gln | Arg | Leu | Ile | Lys | Glu | Ala | Cys | Asp | |
| | | | 50 | | | | 55 | | | | | 60 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| gaa | tca | cgc | ttt | gat | aaa | aac | tta | agt | caa | gcg | ctt | aaa | ttt | gta | cgt | 240 |
| Glu | Ser | Arg | Phe | Asp | Lys | Asn | Leu | Ser | Gln | Ala | Leu | Lys | Phe | Val | Arg | |
| | | | 65 | | | | 70 | | | | | 75 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| gat | ttt | gca | gga | gac | ggg | tta | ttt | aca | agc | tgg | acg | cat | gaa | aaa | aat | 288 |
| Asp | Phe | Ala | Gly | Asp | Gly | Leu | Phe | Thr | Ser | Trp | Thr | His | Glu | Lys | Asn | |
| | 80 | | | | 85 | | | | | 90 | | | | | 95 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| tgg | aaa | aaa | gcg | cat | aat | atc | tta | ctt | cca | agc | ttc | agt | cag | cag | gca | 336 |
| Trp | Lys | Lys | Ala | His | Asn | Ile | Leu | Leu | Pro | Ser | Phe | Ser | Gln | Gln | Ala | |
| | | | 100 | | | | | | 105 | | | | | 110 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| atg | aaa | ggc | tat | cat | gcg | atg | atg | gtc | gat | atc | gcc | gtg | cag | ctt | gtt | 384 |
| Met | Lys | Gly | Tyr | His | Ala | Met | Met | Val | Asp | Ile | Ala | Val | Gln | Leu | Val | |
| | | | 115 | | | | | 120 | | | | | 125 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| caa | aag | tgg | gag | cgt | cta | aat | gca | gat | gag | cat | att | gaa | gta | ccg | gaa | 432 |
| Gln | Lys | Trp | Glu | Arg | Leu | Asn | Ala | Asp | Glu | His | Ile | Glu | Val | Pro | Glu | |
| | | | 130 | | | | 135 | | | | | 140 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| gac | atg | aca | cgt | tta | acg | ctt | gat | aca | att | ggg | ctt | tgc | ggc | ttt | aac | 480 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | |
|---|-----------------|
| Asp Met Thr Arg Leu Thr Leu Asp Thr Ile Gly Leu Cys Gly Phe Asn | |
| 145 | 150 155 |
| tat cgc ttt aac agc ttt tac cga gat cag cct cat cca ttt att aca | 528 |
| Tyr Arg Phe Asn Ser Phe Tyr Arg Asp Gln Pro His Pro Phe Ile Thr | |
| 160 | 165 170 175 |
| agt atg gtc cgt gca ctg gat gaa gca atg aac aag ctg cag cga gca | 576 |
| Ser Met Val Arg Ala Leu Asp Glu Ala Met Asn Lys Leu Gln Arg Ala | |
| | 180 185 190 |
| aat cca gac gac cca gct tat gat gaa aac aag cgc cag ttt caa gaa | 624 |
| Asn Pro Asp Asp Pro Ala Tyr Asp Glu Asn Lys Arg Gln Phe Gln Glu | |
| | 195 200 205 |
| gat atc aag gtg atg aac gac cta gta gat aaa att att gca gat cgc | 672 |
| Asp Ile Lys Val Met Asn Asp Leu Val Asp Lys Ile Ile Ala Asp Arg | |
| | 210 215 220 |
| aaa gca agc ggt gaa caa agc gat gat tta tta acg cat atg cta aac | 720 |
| Asn Ala Ser Gly Glu Gln Ser Asp Asp Leu Leu Thr His Met Leu Asn | |
| | 225 230 235 |
| gga aaa gat cca gaa acg ggt gag ccg ctt gat gac gag aac att cgc | 768 |
| Gly Lys Asp Pro Glu Thr Gly Glu Pro Leu Asp Asp Glu Asn Ile Arg | |
| | 240 245 250 255 |
| tat caa att att aca ttc tta att gcg gga cac gaa aca aca agt ggt | 816 |
| Tyr Gln Ile Ile Thr Phe Leu Ile Ala Gly His Glu Thr Thr Ser Gly | |
| | 260 265 270 |
| ctt tta tca ttt gcg ctg tat ttc tta gtg aaa aat cca cat gta tta | 864 |
| Leu Leu Ser Phe Ala Leu Tyr Phe Leu Val Lys Asn Pro His Val Leu | |
| | 275 280 285 |
| caa aaa gca gca gaa gaa gca gca cga gtt cta gta gat cct gtt cca | 912 |
| Gln Lys Ala Ala Glu Glu Ala Ala Arg Val Leu Val Asp Pro Val Pro | |
| | 290 295 300 |
| agc tac aaa caa gtc aaa cag ctt aaa tat gtc ggc atg gtc tta aac | 960 |
| Arg Tyr Lys Gln Val Lys Gln Leu Lys Tyr Val Gly Met Val Leu Asn | |
| | 305 310 315 |
| gaa gcg ctg cgc tta tgg cca act gct cct gcg ttt tcc cta tat gca | 1008 |
| Glu Ala Leu Arg Leu Trp Pro Thr Ala Pro Ala Phe Ser Leu Tyr Ala | |
| | 320 325 330 335 |
| aaa gaa gat acg gtg ctt gga gga gaa tat cct tta gaa aaa ggc gac | 1056 |
| Lys Glu Asp Thr Val Leu Gly Gly Glu Tyr Pro Leu Glu Lys Gly Asp | |
| | 340 345 350 |
| gaa cta atg gtt ctg att cct cag ctt cac cgt gat aaa aca att tgg | 1104 |
| Glu Leu Met Val Leu Ile Pro Gln Leu His Arg Asp Lys Thr Ile Trp | |
| | 355 360 365 |
| gga gac gat gtg gaa gag ttc cgt cca gag cgt ttt gaa aat cca agt | 1152 |
| Gly Asp Asp Val Glu Glu Phe Arg Pro Glu Arg Phe Glu Asn Pro Ser | |
| | 370 375 380 |
| gcg att ccg cag cat gcg ttt aaa ccg ttt gga aac ggt cag cgt gcg | 1200 |
| Ala Ile Pro Gln His Ala Phe Lys Pro Phe Gly Asn Gly Gln Arg Ala | |
| | 385 390 395 |

| | |
|---|------|
| tgt atc ggt cag cag ttc gct ctt cat gaa gca acg ctg gta ctt ggt | 1248 |
| Cys Ile Gly Gln Gln Phe Ala Leu His Glu Ala Thr Leu Val Leu Gly | |
| 400 405 410 415 | |
| atg atg cta aaa cac ttt gac ttt gaa gat cat aca aac tac gag ctg | 1296 |
| Met Met Leu Lys His Phe Asp Phe Glu Asp His Thr Asn Tyr Glu Leu | |
| 420 425 430 | |
| gat att aaa gaawact tta acg tta aaa cct gaa ggc ttt gtg gta aaa | 1344 |
| Asp Ile Lys Glu Thr Leu Thr Leu Lys Pro Glu Gly Phe Val Val Lys | |
| 435 440 445 | |
| gca aaa tgc aaa aaa att ccg ctt ggc ggt att cct tca cct agc act | 1392 |
| Ala Lys Ser Lys Lys Ile Pro Leu Gly Gly Ile Pro Ser Pro Ser Thr | |
| 450 455 460 | |
| gaa cag tct gct aaa aaa gta cgc aaa aag gca gaa aac gct cat aat | 1440 |
| Glu Gln Ser Ala Lys Lys Val Arg Lys Lys Ala Glu Asn Ala His Asn | |
| 465 470 475 | |
| ccg ctg ctt gtg cta tac ggt tca aat atg gga aca gct gaa gga | 1488 |
| Pro Leu Leu Val Leu Tyr Gly Ser Asn Met Gly Thr Ala Glu Gly | |
| 480 485 490 495 | |
| acg gcg cgt gat tta gca gat att gca atg agc aaa gga ttt gca ecg | 1536 |
| Thr Ala Arg Asp Leu Ala Asp Ile Ala Met Ser Lys Gly Phe Ala Pro | |
| 500 505 510 | |
| cag gtc gca acg ctt gat tca cac gcc gga aat ctt ccg ccg gaa gga | 1584 |
| Gln Val Ala Thr Leu Asp Ser His Ala Gly Asn Leu Pro Arg Glu Gly | |
| 515 520 525 | |
| gct gta tta att gta acg gcg tct tat aac ggt cat ccg cct gat aac | 1632 |
| Ala Val Leu Ile Val Thr Ala Ser Tyr Asn Gly His Pro Pro Asp Asn | |
| 530 535 540 | |
| gca aag caa ttt gtc gac tgg tta gac caa gcg tct gct gat gaa gta | 1680 |
| Ala Lys Gln Phe Val Asp Trp Leu Asp Gln Ala Ser Ala Asp Glu Val | |
| 545 550 555 | |
| gga ggc gtt cgc tac tcc gta ttt gga tgc ggc gat aaa aac tgg gct | 1728 |
| Gly Val Arg Tyr Ser Val Phe Gly Cys Gly Asp Lys Asn Trp Ala | |
| 560 565 570 575 | |
| act acg tat caa aaa gtg cct gct ttt atc gat gaa acg ctt gcc gct | 1776 |
| Thr Thr Tyr Gln Lys Val Pro Ala Phe Ile Asp Glu Thr Leu Ala Ala | |
| 580 585 590 | |
| aaa ggg gca gaa aac atc gct gac cgc ggt gaa gca gat gca agc gac | 1824 |
| Lys Gly Ala Glu Asn Ile Ala Asp Arg Gly Glu Ala Asp Ala Ser Asp | |
| 595 600 605 | |
| gac ttt gaa ggc aca tat gaa gaa tgg cgt gaa cat atg tgg agt gac | 1872 |
| Asp Phe Glu Gly Thr Tyr Glu Glu Trp Arg Glu His Met Trp Ser Asp | |
| 610 615 620 | |
| gta gca gcc tac ttt aac ctc gac att gaa aac agt gaa gat aat aaa | 1920 |
| Val Ala Ala Tyr Phe Asn Leu Asp Ile Glu Asn Ser Glu Asp Asn Lys | |
| 625 630 635 | |
| tct act ctt tca ctt caa ttt gtc gac agc gcc gcg gat atg ccg ctt | 1968 |
| Ser Thr Leu Ser Leu Gln Phe Val Asp Ser Ala Ala Asp Met Pro Leu | |
| 640 645 650 655 | |

| | |
|---|------|
| gcg aaa atg cac ggt gcg ttt tca acg aac gtc gta gca agc aaa gaa Ala Lys Met His Gly Ala Phe Ser Thr Asn Val Val Ala Ser Lys Glu 660 665 670 | 2016 |
| ctt caa cag cca ggc agt gca cga agc acg cga cat ctt gaa att gaa Leu Gln Gln Pro Gly Ser Ala Arg Ser Thr Arg His Leu Glu Ile Glu 675 680 685 | 2064 |
| ctt cca aaa gaa gct tct tat caa gaa gga gat cat tta ggt gtt att Leu Pro Lys Glu Ala Ser Tyr Gln Glu Gly Asp His Leu Gly Val Ile 690 695 700 | 2112 |
| cct cgc aac tat gaa gga ata gta aac cgt gta aca gca agg ttc ggc Pro Arg Asn Tyr Glu Gly Ile Val Asn Arg Val Thr Ala Arg Phe Gly 705 710 715 | 2160 |
| cta gat gca tca cag caa atc cgt ctg gaa gca gaa gaa gaa aaa tta Leu Asp Ala Ser Gln Gln Ile Arg Leu Glu Ala Glu Glu Glu Lys Leu 720 725 730 735 | 2208 |
| cat ttg cca ctc gct aaa aca gta tcc gta gaa gag ctt ctg caa Ala His Leu Pro Leu Ala Lys Thr Val Ser Val Glu Glu Leu Leu Gln 740 745 750 | 2256 |
| tac gtg gag ctt caa gat cct gtt acg cgc acg cag ctt cgc gca atg Tyr Val Glu Leu Gln Asp Pro Val Thr Arg Thr Gln Leu Arg Ala Met 755 760 765 | 2304 |
| gct gct aaa acg gtc tgc ccg ccg cat aaa gta gag ctt gaa gcc ttg Ala Ala Lys Thr Val Cys Pro Pro His Lys Val Glu Leu Glu Ala Leu 770 775 780 | 2352 |
| ctt gaa aag caa gcc tac aaa gaa caa gtg ctg gca aaa cgt tta aca Leu Glu Lys Gln Ala Tyr Lys Glu Gln Val Leu Ala Lys Arg Leu Thr 785 790 795 | 2400 |
| atg ctt gaa ctg ctt gaa aaa tac ccg gcg tgt gaa atg aaa ttc agc Met Leu Glu Leu Leu Glu Lys Tyr Pro Ala Cys Glu Met Lys Phe Ser 800 805 810 815 | 2448 |
| gtt atc gcc ctt ctg cca agc ata cgc ccg cgc tat tac tcg att Glu Phe Ile Ala Leu Leu Pro Ser Ile Arg Pro Arg Tyr Tyr Ser Ile 820 825 830 | 2496 |
| tct tca tca cct cgt gtc gat gaa aaa caa gca agc atc acg gtc agc Ser Ser Ser Pro Arg Val Asp Glu Lys Gln Ala Ser Ile Thr Val Ser 835 840 845 | 2544 |
| gtt gtc tca gga gaa gcg tgg agc gga tat gga gaa tat aaa gga att Val Val Ser Gly Glu Ala Trp Ser Gly Tyr Gly Glu Tyr Lys Gly Ile 850 855 860 | 2592 |
| gcg tcg aac tat ctt gcc gag ctg caa gaa gga gat acg att acg tgc Ala Ser Asn Tyr Leu Ala Glu Leu Gln Glu Gly Asp Thr Ile Thr Cys 865 870 875 | 2640 |
| ttt att tcc aca ccg cag tca gaa ttt acg ctg cca aaa gac cct gaa Phe Ile Ser Thr Pro Gln Ser Glu Phe Thr Leu Pro Lys Asp Pro Glu 880 885 890 895 | 2688 |
| acg ccg ctt atc atg gtc gga ccg gga aca ggc gtc gcg ccg ttt aga Thr Pro Leu Ile Met Val Gly Pro Gly Thr Gly Val Ala Pro Phe Arg | 2736 |

| 900 | 905 | 910 | |
|---|------|------|------|
| ggc ttt gtg cag gcg cgc aaa cag cta aaa gaa caa gga cag tca ctt | | | 2784 |
| Gly Phe Val Gln Ala Arg Lys Gln Leu Lys Glu Gln Gly Gln Ser Leu | | | |
| 915 | 920 | 925 | |
| gga gaa gca cat tta tac ttc ggc tgc cgt tca cct cat gaa gac tat | | | 2832 |
| Gly Glu Ala His Leu Tyr Phe Gly Cys Arg Ser Pro His Glu Asp Tyr | | | |
| 930 | 935 | 940 | |
| ctg tat caa gaa gag ctt gaa aac gcc caa agc gaa ggc atc att acg | | | 2880 |
| Leu Tyr Gln Glu Glu Leu Glu Asn Ala Gln Ser Glu Gly Ile Ile Thr | | | |
| 945 | 950 | 955 | |
| ctt cat acc gct ttt tct cgc atg cca aat cag ccg aaa aca tac gtt | | | 2928 |
| Leu His Thr Ala Phe Ser Arg Met Pro Asn Gln Pro Lys Thr Tyr Val | | | |
| 960 | 965 | 970 | 975 |
| cag cac gta atg gaa caa gac ggc aag aaa ttg att gaa ctt ctt gat | | | 2976 |
| Gln His Val Met Glu Gln Asp Gly Lys Lys Leu Ile Glu Leu Leu Asp | | | |
| 980 | 985 | 990 | |
| caa gga gcg cac ttc tat att tgc gga gac gga agc caa atg gca cct | | | 3024 |
| Gln Gly Ala His Phe Tyr Ile Cys Gly Asp Gly Ser Gln Met Ala Pro | | | |
| 995 | 1000 | 1005 | |
| gcc gtt gaa gca acg ctt atg aaa agc tat gct gac gtt cac caa gtg | | | 3072 |
| Ala Val Glu Ala Thr Leu Met Lys Ser Tyr Ala Asp Val His Gln Val | | | |
| 1010 | 1015 | 1020 | |
| agt gaa gca gac gct cgc tta tgg cgt cag cag cta gaa gaa aaa ggc | | | 3120 |
| Ser Glu Ala Asp Ala Arg Leu Trp Leu Gln Gln Leu Glu Glu Lys Gly | | | |
| 1025 | 1030 | 1035 | |
| cga tac gca aaa gac gtg tgg gct ggg taa | | | 3150 |
| Arg Tyr Ala Lys Asp Val Trp Ala Gly | | | |
| 1040 | 1045 | | |

<210> 2

<211> 1048

<212> PRT

<213> Bacillus megaterium

<400> 2

Thr Ile Lys Glu Met Pro Gln Pro Lys Thr Phe Gly Glu Leu Lys Asn
 1 5 10 15

~~Leu Pro Leu Leu Asn Thr Asp Lys Pro Val Gln Ala Leu Met Lys Ile~~
 20 25 30

Ala Asp Glu Leu Gly Glu Ile Phe Lys Phe Glu Ala Pro Gly Arg Val
 35 40 45

Thr Arg Tyr Leu Ser Ser Gln Arg Leu Ile Lys Glu Ala Cys Asp Glu
 50 55 60

Ser Arg Phe Asp Lys Asn Leu Ser Gln Ala Leu Lys Phe Val Arg Asp
 65 70 75 80

Phe Ala Gly Asp Gly Leu Phe Thr Ser Trp Thr His Glu Lys Asn Trp
 85 90 95

Lys Lys Ala His Asn Ile Leu Leu Pro Ser Phe Ser Gln Gln Ala Met
100 105 110

Lys Gly Tyr His Ala Met Met Val Asp Ile Ala Val Gln Leu Val Gln
115 120 125

Lys Trp Glu Arg Leu Asn Ala Asp Glu His Ile Glu Val Pro Glu Asp
130 135 140

Met Thr Arg Leu Thr Leu Asp Thr Ile Gly Leu Cys Gly Phe Asn Tyr
145 150 155 160

Arg Phe Asn Ser Phe Tyr Arg Asp Gln Pro His Pro Phe Ile Thr Ser
165 170 175

Met Val Arg Ala Leu Asp Glu Ala Met Asn Lys Leu Gln Arg Ala Asn
180 185 190

Pro Asp Asp Pro Ala Tyr Asp Glu Asn Lys Arg Gln Phe Gln Glu Asp
195 200 205

Lys Val Met Asn Asp Leu Val Asp Lys Ile Ile Ala Asp Arg Lys
210 215 220

Ala Ser Gly Glu Gln Ser Asp Asp Leu Leu Thr His Met Leu Asn Gly
225 230 235 240

Lys Asp Pro Glu Thr Gly Glu Pro Leu Asp Asp Glu Asn Ile Arg Tyr
245 250 255

Gln Ile Ile Thr Phe Leu Ile Ala Gly His Glu Thr Thr Ser Gly Leu
260 265 270

Leu Ser Phe Ala Leu Tyr Phe Leu Val Lys Asn Pro His Val Leu Gln
275 280 285

Lys Ala Ala Glu Glu Ala Ala Arg Val Leu Val Asp Pro Val Pro Ser
290 295 300

Tyr Lys Gln Val Lys Gln Leu Lys Tyr Val Gly Met Val Leu Asn Glu
305 310 315 320

Ala Leu Arg Leu Trp Pro Thr Ala Pro Ala Phe Ser Leu Tyr Ala Lys
325 330 335

Glu Asp Thr Val Leu Gly Gly Glu Tyr Pro Leu Glu Lys Gly Asp Glu
340 345 350

~~Leu Met Val Leu Ile Pro Gln Leu His Arg Asp Lys Thr Ile Trp Gly~~
~~355 360 365~~

Asp Asp Val Glu Glu Phe Arg Pro Glu Arg Phe Glu Asn Pro Ser Ala
370 375 380

Ile Pro Gln His Ala Phe Lys Pro Phe Gly Asn Gly Gln Arg Ala Cys
385 390 395 400

Ile Gly Gln Gln Phe Ala Leu His Glu Ala Thr Leu Val Leu Gly Met
405 410 415

Met Leu Lys His Phe Asp Phe Glu Asp His Thr Asn Tyr Glu Leu Asp
420 425 430

Ile Lys Glu Thr Leu Thr Leu Lys Pro Glu Gly Phe Val Val Lys Ala
435 440 445

Lys Ser Lys Lys Ile Pro Leu Gly Gly Ile Pro Ser Pro Ser Thr Glu
450 455 460

Gln Ser Ala Lys Lys Val Arg Lys Lys Ala Glu Asn Ala His Asn Thr
465 470 475 480

Pro Leu Leu Val Leu Tyr Gly Ser Asn Met Gly Thr Ala Glu Gly Thr
485 490 495

Ala Arg Asp Leu Ala Asp Ile Ala Met Ser Lys Gly Phe Ala Pro Gln
500 505 510

Val Ala Thr Leu Asp Ser His Ala Gly Asn Leu Pro Arg Glu Gly Ala
515 520 525

Val Leu Ile Val Thr Ala Ser Tyr Asn Gly His Pro Pro Asp Asn Ala
530 535 540

Gln Phe Val Asp Trp Leu Asp Gln Ala Ser Ala Asp Glu Val Lys
545 550 555 560

Gly Val Arg Tyr Ser Val Phe Gly Cys Gly Asp Lys Asn Trp Ala Thr
565 570 575

Thr Tyr Gln Lys Val Pro Ala Phe Ile Asp Glu Thr Leu Ala Ala Lys
580 585 590

Gly Ala Glu Asn Ile Ala Asp Arg Gly Glu Ala Asp Ala Ser Asp Asp
595 600 605

Phe Glu Gly Thr Tyr Glu Glu Trp Arg Glu His Met Trp Ser Asp Val
610 615 620

Ala Ala Tyr Phe Asn Leu Asp Ile Glu Asn Ser Glu Asp Asn Lys Ser
625 630 635 640

Thr Leu Ser Leu Gln Phe Val Asp Ser Ala Ala Asp Met Pro Leu Ala
645 650 655

Lys Met His Gly Ala Phe Ser Thr Asn Val Val Ala Ser Lys Glu Leu
660 665 670

Gln Gln Pro Gly Ser Ala Arg Ser Thr Arg His Leu Glu Ile Glu Leu
675 680 685

~~Pro Lys Glu Ala Ser Tyr Gln Glu Gly Asp His Leu Gly Val Ile Pro~~
690 695 700

Arg Asn Tyr Glu Gly Ile Val Asn Arg Val Thr Ala Arg Phe Gly Leu
705 710 715 720

Asp Ala Ser Gln Gln Ile Arg Leu Glu Ala Glu Glu Glu Lys Leu Ala
725 730 735

His Leu Pro Leu Ala Lys Thr Val Ser Val Glu Glu Leu Leu Gln Tyr
740 745 750

Val Glu Leu Gln Asp Pro Val Thr Arg Thr Gln Leu Arg Ala Met Ala
755 760 765

Ala Lys Thr Val Cys Pro Pro His Lys Val Glu Leu Glu Ala Leu Leu
770 775 780

Glu Lys Gln Ala Tyr Lys Glu Gln Val Leu Ala Lys Arg Leu Thr Met
785 790 795 800

Leu Glu Leu Leu Glu Lys Tyr Pro Ala Cys Glu Met Lys Phe Ser Glu
805 810 815

Phe Ile Ala Leu Leu Pro Ser Ile Arg Pro Arg Tyr Tyr Ser Ile Ser
820 825 830

Ser Ser Pro Arg Val Asp Glu Lys Gln Ala Ser Ile Thr Val Ser Val
835 840 845

Val Ser Gly Glu Ala Trp Ser Gly Tyr Gly Glu Tyr Lys Gly Ile Ala
850 855 860

Ser Asn Tyr Leu Ala Glu Leu Gln Glu Gly Asp Thr Ile Thr Cys Phe
865 870 875 880

Phe Ser Thr Pro Gln Ser Glu Phe Thr Leu Pro Lys Asp Pro Glu Thr
885 890 895

Pro Leu Ile Met Val Gly Pro Gly Thr Gly Val Ala Pro Phe Arg Gly
900 905 910

Phe Val Gln Ala Arg Lys Gln Leu Lys Glu Gln Gly Gln Ser Leu Gly
915 920 925

Glu Ala His Leu Tyr Phe Gly Cys Arg Ser Pro His Glu Asp Tyr Leu
930 935 940

Tyr Gln Glu Glu Leu Glu Asn Ala Gln Ser Glu Gly Ile Ile Thr Leu
945 950 955 960

His Thr Ala Phe Ser Arg Met Pro Asn Gln Pro Lys Thr Tyr Val Gln
965 970 975

His Val Met Glu Gln Asp Gly Lys Lys Leu Ile Glu Leu Leu Asp Gln
980 985 990

Gly Ala His Phe Tyr Ile Cys Gly Asp Gly Ser Gln Met Ala Pro Ala
995 1000 1005

Val Glu Ala Thr Leu Met Lys Ser Tyr Ala Asp Val His Gln Val Ser
1010 1015 1020

Glu Ala Asp Ala Arg Leu Trp Leu Gln Gln Leu Glu Glu Lys Gly Arg
1025 1030 1035 1040

Tyr Ala Lys Asp Val Trp Ala Gly
1045

<210> 3

<211> 30

<212> DNA

<213> Künstliche Sequenz

<220>

<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 3
gcaggagacg gggtgnnnac aagctggacg

30

<210> 4
<211> 30
<212> DNA
<213> Künstliche Sequenz

<220>
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 4
cgtccagctt gtnnncaacc cgtctcctgc

30

<210> 5
<211> 34
<212> DNA
<213> Künstliche Sequenz

<220>
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 5
gaagcaatga acaagnnnca gcgagcaaat ccag

34

<210> 6
<211> 30
<212> DNA
<213> Künstliche Sequenz

<220>
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 6
ctggatttgc tcgctgnnnc ttgttcattg

30

<210> 7
<211> 41
<212> DNA
<213> Künstliche Sequenz

<220>
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 7
gctttgataa aaacttaaag teaannnctt aaatttgtac g

41

<210> 8
<211> 40
<212> DNA
<213> Künstliche Sequenz

<220>
<223> Beschreibung der künstlichen Sequenz: PCR-Primer

<400> 8
cgtacaaatt taagnnnttg acttaagttt ttatcaaagc

40

<210> 9

<211> 1049

<212> PRT

<213> Bacillus megaterium

<400> 9

Met Thr Ile Lys Glu Met Pro Gln Pro Lys Thr Phe Gly Glu Leu Lys
 1 5 10 15

Asn Leu Pro Leu Leu Asn Thr Asp Lys Pro Val Gln Ala Leu Met Lys
 20 25 30

Ile Ala Asp Glu Leu Gly Glu Ile Phe Lys Phe Glu Ala Pro Gly Arg
 35 40 45

Val Thr Arg Tyr Leu Ser Ser Gln Arg Leu Ile Lys Glu Ala Cys Asp
 50 55 60

Ser Arg Phe Asp Lys Asn Leu Ser Gln Ala Leu Lys Phe Val Arg
 70 75 80

Asp Phe Ala Gly Asp Gly Leu Phe Thr Ser Trp Thr His Glu Lys Asn
 85 90 95

Trp Lys Lys Ala His Asn Ile Leu Leu Pro Ser Phe Ser Gln Gln Ala
 100 105 110

Met Lys Gly Tyr His Ala Met Met Val Asp Ile Ala Val Gln Leu Val
 115 120 125

Gln Lys Trp Glu Arg Leu Asn Ala Asp Glu His Ile Glu Val Pro Glu
 130 135 140

Asp Met Thr Arg Leu Thr Leu Asp Thr Ile Gly Leu Cys Gly Phe Asn
 145 150 155 160

Tyr Arg Phe Asn Ser Phe Tyr Arg Asp Gln Pro His Pro Phe Ile Thr
 165 170 175

Met Val Arg Ala Leu Asp Glu Ala Met Asn Lys Leu Gln Arg Ala
 180 185 190

Asn Pro Asp Asp Pro Ala Tyr Asp Glu Asn Lys Arg Gln Phe Gln Glu
 195 200 205

Asp Ile Lys Val Met Asn Asp Leu Val Asp Lys Ile Ile Ala Asp Arg
 210 215 220

Lys Ala Ser Gly Glu Gln Ser Asp Asp Leu Leu Thr His Met Leu Asn
 225 230 235 240

Gly Lys Asp Pro Glu Thr Gly Glu Pro Leu Asp Asp Glu Asn Ile Arg
 245 250 255

Tyr Gln Ile Ile Thr Phe Leu Ile Ala Gly His Glu Thr Thr Ser Gly
 260 265 270

Leu Leu Ser Phe Ala Leu Tyr Phe Leu Val Lys Asn Pro His Val Leu
 275 280 285

Gln Lys Ala Ala Glu Glu Ala Ala Arg Val Leu Val Asp Pro Val Pro

| | | |
|---|---|---------------------|
| 290 | 295 | 300 |
| Ser Tyr Lys Gln Val | Lys Gln Leu Lys Tyr Val | Gly Met Val Leu Asn |
| 305 | 310 | 315 320 |
| Glu Ala Leu Arg Leu Trp | Pro Thr Ala Pro Ala Phe Ser Leu Tyr Ala | |
| 325 | 330 | 335 |
| Lys Glu Asp Thr Val Leu Gly Gly Glu Tyr Pro Leu Glu Lys Gly Asp | | |
| 340 | 345 | 350 |
| Glu Leu Met Val Leu Ile Pro Gln Leu His Arg Asp Lys Thr Ile Trp | | |
| 355 | 360 | 365 |
| Gly Asp Asp Val Glu Glu Phe Arg Pro Glu Arg Phe Glu Asn Pro Ser | | |
| 370 | 375 | 380 |
| Ala Ile Pro Gln His Ala Phe Lys Pro Phe Gly Asn Gly Gln Arg Ala | | |
| 385 | 390 | 395 400 |
| s Ile Gly Gln Gln Phe Ala Leu His Glu Ala Thr Leu Val Leu Gly | | |
| 405 | 410 | 415 |
| Met Met Leu Lys His Phe Asp Phe Glu Asp His Thr Asn Tyr Glu Leu | | |
| 420 | 425 | 430 |
| Asp Ile Lys Glu Thr Leu Thr Leu Lys Pro Glu Gly Phe Val Val Lys | | |
| 435 | 440 | 445 |
| Ala Lys Ser Lys Lys Ile Pro Leu Gly Gly Ile Pro Ser Pro Ser Thr | | |
| 450 | 455 | 460 |
| Glu Gln Ser Ala Lys Lys Val Arg Lys Lys Ala Glu Asn Ala His Asn | | |
| 465 | 470 | 475 480 |
| Thr Pro Leu Leu Val Leu Tyr Gly Ser Asn Met Gly Thr Ala Glu Gly | | |
| 485 | 490 | 495 |
| Thr Ala Arg Asp Leu Ala Asp Ile Ala Met Ser Lys Gly Phe Ala Pro | | |
| 500 | 505 | 510 |
| n Val Ala Thr Leu Asp Ser His Ala Gly Asn Leu Pro Arg Glu Gly | | |
| 515 | 520 | 525 |
| Ala Val Leu Ile Val Thr Ala Ser Tyr Asn Gly His Pro Pro Asp Asn | | |
| 530 | 535 | 540 |
| Ala Lys Gln Phe Val Asp Trp Leu Asp Gln Ala Ser Ala Asp Glu Val | | |
| 545 | 550 | 555 560 |
| Lys Gly Val Arg Tyr Ser Val Phe Gly Cys Gly Asp Lys Asn Trp Ala | | |
| 565 | 570 | 575 |
| Thr Thr Tyr Gln Lys Val Pro Ala Phe Ile Asp Glu Thr Leu Ala Ala | | |
| 580 | 585 | 590 |
| Lys Gly Ala Glu Asn Ile Ala Asp Arg Gly Glu Ala Asp Ala Ser Asp | | |
| 595 | 600 | 605 |
| Asp Phe Glu Gly Thr Tyr Glu Glu Trp Arg Glu His Met Trp Ser Asp | | |
| 610 | 615 | 620 |
| Val Ala Ala Tyr Phe Asn Leu Asp Ile Glu Asn Ser Glu Asp Asn Lys | | |

| 625 | 630 | 635 | 640 |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------|
| Ser Thr Leu Ser | Leu Gln Phe Val Asp | Ser Ala Ala Asp Met | Pro Leu |
| | 645 | 650 | 655 |
| Ala Lys Met His | Gly Ala Phe Ser Thr | Asn Val Val Ala Ser | Lys Glu |
| | 660 | 665 | 670 |
| Leu Gln Gln Pro | Gly Ser Ala Arg Ser Thr | Arg His Leu Glu Ile | Glu |
| | 675 | 680 | 685 |
| Leu Pro Lys Glu | Ala Ser Tyr Gln Glu Gly | Asp His Leu Gly Val | Ile |
| | 690 | 695 | 700 |
| Pro Arg Asn Tyr | Glu Gly Ile Val Asn Arg | Val Thr Ala Arg Phe | Gly |
| | 705 | 710 | 715 |
| Leu Asp Ala Ser | Gln Gln Ile Arg Leu Glu | Ala Glu Glu Glu Lys | Leu |
| | 725 | 730 | 735 |
| a His Leu Pro | Leu Ala Lys Thr Val Ser | Val Glu Glu Leu Leu | Gln |
| | 740 | 745 | 750 |
| Tyr Val Glu Leu | Gln Asp Pro Val Thr Arg | Thr Gln Leu Arg Ala | Met |
| | 755 | 760 | 765 |
| Ala Ala Lys Thr | Val Cys Pro Pro His Lys | Val Glu Leu Glu Ala | Leu |
| | 770 | 775 | 780 |
| Leu Glu Lys Gln | Ala Tyr Lys Glu Gln Val | Leu Ala Lys Arg Leu | Thr |
| | 785 | 790 | 795 |
| Met Leu Glu Leu | Leu Glu Lys Tyr Pro Ala | Cys Glu Met Lys Phe | Ser |
| | 805 | 810 | 815 |
| Glu Phe Ile Ala | Leu Leu Pro Ser Ile Arg | Pro Arg Tyr Tyr Ser | Ile |
| | 820 | 825 | 830 |
| Ser Ser Ser Pro | Arg Val Asp Glu Lys Gln | Ala Ser Ile Thr Val | Ser |
| | 835 | 840 | 845 |
| l Val Ser Gly | Glu Ala Trp Ser Gly Tyr | Gly Glu Tyr Lys Gly | Ile |
| | 850 | 855 | 860 |
| Ala Ser Asn Tyr | Leu Ala Glu Leu Gln Glu | Gly Asp Thr Ile Thr | Cys |
| | 865 | 870 | 875 |
| Phe Ile Ser Thr | Pro Gln Ser Glu Phe Thr | Leu Pro Lys Asp Pro | Glu |
| | 885 | 890 | 895 |
| Thr Pro Leu Ile | Met Val Gly Pro Gly Thr | Gly Val Ala Pro Phe | Arg |
| | 900 | 905 | 910 |
| Gly Phe Val Gln | Ala Arg Lys Gln Leu Lys | Glu Gln Gly Gln Ser | Leu |
| | 915 | 920 | 925 |
| Gly Glu Ala His | Leu Tyr Phe Gly Cys Arg | Ser Pro His Glu Asp | Tyr |
| | 930 | 935 | 940 |
| Leu Tyr Gln Glu | Glu Leu Glu Asn Ala Gln | Ser Glu Gly Ile Ile | Thr |
| | 945 | 950 | 955 |
| Leu His Thr Ala | Phe Ser Arg Met Pro Asn | Gln Pro Lys Thr Tyr | Val |

| | | | | | |
|---|------|--|------|--|------|
| | 965 | | 970 | | 975 |
| Gln His Val Met Glu Gln Asp Gly Lys Lys Leu Ile Glu Leu Leu Asp | | | | | |
| | 980 | | 985 | | 990 |
| Gln Gly Ala His Phe Tyr Ile Cys Gly Asp Gly Ser Gln Met Ala Pro | | | | | |
| | 995 | | 1000 | | 1005 |
| Ala Val Glu Ala Thr Leu Met Lys Ser Tyr Ala Asp Val His Gln Val | | | | | |
| | 1010 | | 1015 | | 1020 |
| Ser Glu Ala Asp Ala Arg Leu Trp Leu Gln Gln Leu Glu Glu Lys Gly | | | | | |
| | 1025 | | 1030 | | 1035 |
| | | | | | 1040 |
| Arg Tyr Ala Lys Asp Val Trp Ala Gly | | | | | |
| | 1045 | | | | |

Patentansprüche

1. Cytochrom P450 Monooxygenase, welche zu wenigstens einer
5 der folgenden Reaktionen befähigt ist:
- a) Oxidation gegebenenfalls substituierter N-, O- oder
S-heterocyclischer ein-, zwei- oder mehrkerniger
aromatischer Verbindungen;
 - 10 b) Oxidation gegebenenfalls substituierter ein- oder
mehrkerniger Aromaten;
 - c) Oxidation geradkettiger oder verzweigter Alkane und
Alkene;
 - d) Oxidation gegebenenfalls substituierter Cycloalkane
und Cycloalkene
- 15 2. Monooxygenase nach Anspruch 1, deren Substrat-bindender
Bereich durch ortsspezifische Mutagenese zur funktionalen
Aufnahme des zu oxidierenden Substrats befähigt ist.
- 20 3. Monooxygenase nach Anspruch 1 oder 2, abgeleitet von
Cytochrom P450 Monooxygenasen bakteriellen Ursprungs.
4. Monooxygenase nach Anspruch 3, abgeleitet von Cytochrom
P450 Monooxygenase BM-3 aus *Bacillus megaterium* mit einer
Aminosäuresequenz gemäß SEQ ID NO:2, welche wenigstens
eine funktionelle Mutation in einem der Aminosäurese-
quenzbereiche 172-224, 39-43, 48-52, 67-70, 330-335, 352-
356, 73-82 und 86-88 aufweist.
-
- 30 5. Monooxygenase nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß
sie wenigstens eine der folgenden ein- oder mehrfachen
Aminosäuresubstitutionen aufweist:
- e) Phe87Val;
 - f) Phe87Val, Leu188Gln; oder
 - 35 g) Phe87Val, Leu188Gln, Ala74Gly;
- sowie funktionale Äquivalente davon.
6. Nukleinsäuresequenz, kodierend für eine Monooxygenase nach

einem der vorherigen Ansprüche.

7. Expressionskonstrukt, enthaltend unter der genetischen
Kontrollenregulativen Nukleinsäuresequenzen eine
5 kodierende Sequenz, welche eine Nukleinsäuresequenz nach
Anspruch 6 umfasst.

8. Vektor, umfassend wenigstens ein Expressionskonstrukt
nach Anspruch 7.

9. Rekombinanter Mikroorganismus, transformiert mit
wenigstens einem Vektor nach Anspruch 8.

10. Mikroorganismus nach Anspruch 9, ausgewählt unter
15 Bakterien der Gattung *Escherichia*.

11. Verfahren zur mikrobiologischen Oxidation einer
Verbindung gemäß der Definition von Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß man

- 20 a1) einen rekombinanten Mikroorganismus nach Anspruch 9
oder 10 in einem Kulturmedium, in Gegenwart eines
exogenen oder intermediär gebildeten Substrats,
kultiviert; oder
a2) ein Substrat-haltiges Reaktionsmedium mit einem
Enzym nach einem der Ansprüche 1 bis 5 inkubiert;
und
b) das gebildete Oxidationsprodukt oder ein
Folgeprodukt davon aus dem Medium isoliert.

30 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das exogene oder intermediär gebildete Substrat
ausgewählt ist unter

- 35 a) gegebenenfalls substituierten N-, O- oder S-
heterocyclischen ein-, zwei- oder mehrkernigen
aromatischen Verbindungen;
b) gegebenenfalls substituierten ein- oder mehrkernigen
Aromaten;
c) geradkettigen oder verzweigten Alkanen und Alkenen;

d) gegebenenfalls substituierten Cycloalkanen und Cycloalkenen.

5 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat intermediär gebildetes Indol ist und man aus dem Medium das anfallende Indigo und/oder Indirubin isoliert, welches durch Oxidation von intermediär gebildetem Indol erzeugt wurde.

10 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß man die Indoloxidation durch Kultivierung der Mikroorganismen in Gegenwart von Sauerstoff bei einer Kultivierungstemperatur von etwa 20 bis 40 °C und einem pH-Wert von etwa 6 bis 9 durchführt.

15 15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß man als exogenes Substrat wenigstens eine Verbindung, ausgewählt unter den oben definierten Gruppen a) bis d), einem Medium zusetzt und die Oxidation durch enzymatische Umsetzung des substrathaltiges Mediums in Gegenwart von Sauerstoff bei einer Temperatur von etwa 20 bis 40 °C und einem pH-Wert von etwa 6 bis 9 durchführt, wobei das substrathaltige Medium außerdem bezogen auf das Substrat einen etwa 10-bis 100-fachen molaren Überschuß an Reduktionsäquivalenten enthält.

20 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß man als exogenes Substrat eine Verbindung, ausgewählt unter Indol, n-Hexan, n-Octan, n-Decan, n-Dodecan, Cumol, 1-Methylindol, 5-Cl- oder Br-Indol, Inden, Benzothiophen, 30 ~~1-Methylindol, 5-Cl- oder Br-Indol, Inden, Benzothiophen,~~ α -, β - und γ -Ionon, Acridin, Naphthalin, 6-Methyl- oder 8-Methylchinolin, Chinolin und Chinaldin, einsetzt.

35 17. Bioreaktor, umfassend ein Enzym nach einem der Ansprüche 1 bis 5 oder einen rekombinanten Mikroorganismus nach einem der Ansprüche 9 oder 10 in immobilisierter Form.

18. Verwendung einer Cytochrom P450 Monooxygenase nach einem

der Ansprüche 1 bis 5, eines Vektors nach Anspruch 8,
oder eines Mikroorganismus nach Anspruch 9 oder 10 zur
mikrobiologischen Oxidation von

- 5 a) ~~gegebenenfalls~~ substituierten N-, O- oder S-
~~heterocyclischen ein-, zwei- oder mehrkernigen~~
~~aromatischen Verbindungen;~~
- b) gegebenenfalls substituierten ein- oder mehrkernigen
Aromaten;
- 10 c) geradkettigen oder verzweigten Alkanen und Alkenen;
und/oder
- d) gegebenenfalls substituierten Cycloalkanen und
Cycloalkenen.

15 19. Verwendung nach Anspruch 18 zur Herstellung von Indigo
und/oder Indirubin.

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft neue Cytochrom P450-Monooxygenasen mit
5 verändertem Substratprofil, dafür kodierende Nukleotidsequenzen, diese Sequenzen enthaltende Expressionskonstrukte und Vektoren, damit transformierte Mikroorganismen, Verfahren zur mikrobiologischen Oxidation verschiedener organischer Substrate wie beispielsweise Verfahren zur Herstellung von Indigo und
10 Indirubin.
